


JABUČASTO VOĆE

BEZ KARENCE

- **ERWIX** - BIOFINGICID, BIOBAKTERICID za suzbijanje - *Erwinia amylovora* (bakteriozna plamenjača) i skladišnih patogena: *Monilia* sp., *Colletotrichum* sp., *Botrytis* sp.
- **SLAVOL VVL** - Stimulator rasta - (indol 3 sirćetna kiselina) - stimuliše razvoj ploda, diferencijaciju cvetnih i rodnih pupoljaka, sprečava opadanje plodova pred berbu.
- **ENERGEN + B** - Huminske kiseline sa Borom - stimuliše cvetanje i oplodnju
- **AMIKSOL** - Aminokiseline - povećava otpornost biljaka na stres i bolesti
- **UNISTART** - Razlaže soli u zemljištu i organska jedinjenja azota i fosfora



Novo!



ERWIX	Bakteriozna plamenjača, (<i>Erwinia amylovora</i>)	5 - 10 l/ha
ENERGEN BOR	Stimulacija oplodnje	250 ml/ha

ERWIX	Bakteriozna plamenjača, (<i>Erwinia amylovora</i>)	5 - 10 l/ha
ENERGEN BOR	Stimulacija oplodnje	250 ml/ha

ERWIX	Bakteriozna plamenjača, (<i>Erwinia amylovora</i>)	5 - 10 l/ha
ENERGEN BOR	Stimulacija oplodnje	250 ml/ha



ERWIX	Trulež plodova, (<i>Botrytis cinerea</i>), (<i>Monilinia fructigena</i>) (<i>Colletotrichum</i> sp.)	15 dana pre berbe 10 l/ha
Slavol VVL + Amiksol	Krupnoća, bolja obojenost i smanjeno opadanje plodova	5 + 2 l/ha

ERWIX	Prouzrokovaci skladišnih bolesti, (<i>Botrytis cinerea</i>), (<i>Monilinia fructigena</i>) (<i>Colletotrichum</i> sp.)	5 dana pre berbe 10 l/ha
Slavol VVL + Amiksol	Krupnoća, bolja obojenost i smanjeno opadanje plodova	5 + 2 l/ha

PRIMENA SLAVOLA VVL	SLAVOL VVL	FOLIJARNO 5l/ha
PRECVETAVANJE		
RAZVOJ PLODA NAKON OPLODNJE (PLOD VELICINE LEŠNIKA)	SLAVOL VVL	FOLIJARNO 5l/ha
NAKON JUNSKOG OPADANJA PLODOVA	SLAVOL VVL	FOLIJARNO 5l/ha
PERIOD JUL, AVGUST -15 I 5 DANA PRED BERBU	SLAVOL VVL	FOLIJARNO 5l/ha
Utrošak vode 600 do 1000 litara po hektaru. Erwix nema karencu i bezbedan je za pčele.		

agrounik


Nauka posvećena prirodi



ERWIX se koristi za suzbijanje fitopatogenih gljiva i bakterija. ERWIX sadrži saprofitnu bakteriju *Bacillus subtilis*, koja pospešuje rast biljaka i bezbedna je za životnu sredinu i čoveka (GRAS-General Recognized As Safety). ERWIX nije toksičan za pčele, nema karenco, može da se primeni i u vreme berbe plodova. Preporučuje se za organsku i konvencionalnu poljoprivrednu proizvodnju.

ERWIX sadrži **sufraktin** pomoću kojeg se *B. subtilis* vezuje za površinu biljke (list, cvet, stablo, koren) i formira **biofilm**. **Kolonizacijom** (naseljavanjem) površine biljke *B. subtilis* sprečava fitopatogene gljive i bakterije da ostvare infekciju. Sufraktin ima direktno antifungalno i antibakterijsko delovanje.

Antagonistički odnosi između ERWIX-a (*B. subtilis*) i *Erwinia amylovora*: U cvet jabuke (ispod cvetne lože) i u list dunje (u lisni nerv), špricem je ubaćena *Erwinia amylovora*. Sledеćeg dana cvetovi i listovi su prskani ERWIX-om. Nakon 7 dana cvetovi i listovi koji su prskani sa ERWIX-om nisu imali simptome bolesti za razliku od kontrolnih na kojima se pojavila bolest.



Antagonistički odnosi između ERWIX-a (*B. subtilis*) i *Colletotrichum* sp., i *Monilia fructigena*: U otvor na jabuci uneti su u svaku jabuku posebno: 1. *Colletotrichum* sp. odnosno *Monilia* sp. U otvor 2. uneti su zajedno ERWIX i *Monilia* / *Colletotrichum*, a u otvor 3. uneta je voda. ERWIX je značajno uticao da na smanjenje simptoma bolesti na jabukama.

